

Iruxol® Neo

Iruxol® Neo favorece la cicatrización

Características y beneficios

- Iruxol® Neo contiene una enzima llamada colagenasa que digiere el colágeno dañado de la piel. Es de crucial importancia, para regenerar el tejido vivo, "deshacer" el colágeno dañado y reutilizar sus componentes para una nueva síntesis. Cuando las colagenasas endógenas, propias de nuestro organismo, no son suficientes para digerir los restos necróticos en la herida, el proceso de curación se ve acelerado aplicando tópicamente pomada de colagenasa.
- Iruxol® Neo contiene neomicina, antibiótico que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. La neomicina es activa frente a la mayoría de microorganismos Gram positivos y Gram negativos y, además, es perfectamente compatible con la colagenasa.

Indicaciones terapéuticas

- Limpieza de todo tipo de heridas.
- Ulceraciones y necrosis
- Úlcera por decúbito
- Congelaciones
- Heridas complicadas: postoperatorias, por accidentes...

La colagenasa es una formulación farmacéutica sin efecto sistémico.

Presentación

C.N.	Contenido	Ud. mínima de venta	Código Smith & Nephew
7733171	Tubo 15 g	10	66358015
9930974	Tubo 30 g	10	66358030



NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD: Iruxol® Neo. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** cada gramo de pomada contiene: Colitripeptidasa A (colagenasa) 0,5 U/L y neomicina (EC) sulfato (eposado en base 3,5 mg. Excipientes: pasta líquida y pasta sólida. **DATOS CLÍNICOS:** Indicación: Limpieza y desbridamiento de heridas, independientemente de su origen y localización. Ulceraciones y necrosis. Ulceraciones en las piernas debidas a varices. Úlcera por decúbito. Gangrena de las extremidades (especialmente diabética, congelaciones. Heridas de evolución complicada postoperatorias: con vasos X, accidentes. Antes de trasplantes cutáneos. **Posología y forma de administración:** Se debe aplicar una vez al día una capa de pomada de aproximadamente 2 mm, directamente sobre la zona a tratar ligeramente humedecida. En necrosis persistentes es posible mejorar la eficacia de la pomada cortando las mismas en el borde o en el centro e intentando aplicar de esta manera parte de la pomada debajo de las necrosis. Se debe evitar que la superficie de la herida se seque, ya que la humedad favorece la actividad de las enzimas. La acción se ablanda las costras secas y duras mediante un vendaje húmedo. Si materia necrótica debe eliminarse al cambiar el apósito; esto se efectúa por medio de pinzas, espátula, tenaza, cuchara afilada o bafando la herida. Puede resultar conveniente cubrir, rutinariamente o por que evita infección, los bordes de la herida con pasta de zinc o similares. **Contraindicaciones:** El producto está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. **Advertencias especiales y precauciones para su uso:** La administración prolongada no se puede descartar la posibilidad de sensibilización. Pueden aparecer sensibilizaciones producidas por microorganismos resistentes, en cuyo caso debe interrumpirse el tratamiento y aplicar la terapia adecuada. **Interacción:** No debe combinarse con otros preparados enzimáticos de administración tópica porque su actividad puede verse inhibida o incluso inactivada. La especialidad no debe utilizarse conjuntamente con antitérmicos, metales pesados, detergentes y jabones, ya que estos inhiben la actividad de la Colagenasa. Sin embargo, sí es compatible con cloranfenicol, neomicina, bacitracina, gentamicina, pirimetamina y yodóidos (p.ej. yodocrómico). No deberá utilizarse localmente con Iruxol® Neo: tetraciclina, gentamicina y tetraciclina. **Embarazo y lactancia:** No existe información que sugiera un efecto adverso del fármaco durante el embarazo o período de lactancia. **Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y utilizar maquinaria:** No se han descrito. **Reacciones adversas:** Las reacciones adversas más frecuentes son debidas a una posible hipersensibilidad al fármaco: infección local, dermatitis, eritema, en cuyo caso debe interrumpirse su administración e instaurarse la terapéutica adecuada. **Sobredosificación:** Debido a las características de este medicamento destinado a uso tópico, no es previsible la posibilidad de producir una intoxicación. **Instrucciones de uso/manipulación:** Para perforar el tubo, se debe utilizar el reverso del tapón roscado. Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. **Condiciones de dispensación:** Con receta médica. **Presentaciones y precio de venta:** Iruxol® Neo tubo 15 g de pomada: PVP 5,00 €; PVP IVA 5,05 €. Iruxol® Neo tubo 30 g de pomada: PVP 10,00 €; PVP IVA 10,20 €. **Condiciones de reembolso por las agencias de Seguridad Social:** No reembolsado por el Sistema Nacional de Salud. **Estimación del coste/tratamiento:** Depende de la superficie y gravedad de la lesión. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, Y DOMICILIO PERMANENTE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** T. Smith & Nephew (S. PO Box, HUL, HU8 2 8PL, Gran Bretaña. **Comercializado en España por:** Smith & Nephew S.A. Fructos, Oribarri 12-4, 08970 - Sant Joan Despí, Barcelona



Thader Sanitaria